

खरीफ एवं रबी की मुख्य फसलों के कीट/रोग एवं नियंत्रण के उपाय

क्र. सं.	नाम फसल	नाम कीट/रोग	नियंत्रण के उपाय
1	बाजरा	कातरा	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकाशपाश का उपयोग करें। 2. क्यूनालफॉस 1.5 प्रतिशत या मिथाईल पैराथिऑन 2 प्रतिशत 25 किलो प्रति हैक्टर की दर से भुरकाव करें या डाईक्लोरोवास 76 ई.सी. 300 मि.ली. या मिथाईल पैराथिऑन 50 प्रतिशत ई.सी. 750 मि.ली. या क्यूनालफॉस 25 ई.सी. 625 मि.ली. का प्रति हैक्टर की दर से छिड़काव करें।
		सफेद लट	<ol style="list-style-type: none"> 1. भ्रंग नियंत्रण हेतु परपौषी वृक्षों पर मोनोक्रोटोफॉस 36 एस.एल. 25 मि.ली. या क्यूनालफॉस 25 ई.सी. 36 मि.ली. या कार्बेरिल 50 प्रतिशत घुलनशील चूर्ण 72 ग्राम 18 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। 2. लट अवस्था में एक किलो बीज में तीन किलो कार्बोफ्यूरान 3 प्रतिशत या क्यूनालफॉस 1.5 प्रतिशत कण मिलाकर बुवाई करें।
		अरगट	सिट्टे निकलते समय ढाई किलो जाईनेब 80 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. या डेढ से 2 किलो मेंकोजेब 75 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. का 3-3 दिन के अन्तराल पर छिड़काव करें।
2	ज्वार	कण्डवा	बीज को 3 ग्राम थाईरम 75 प्रतिशत डब्ल्यू. पी. या 4 ग्राम गंधक 85 प्रतिशत डी.पी. प्रति किलो की दर से उपचारित कर बोयें।
		पत्ती धब्बा	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रतिरोधी किस्मे सी.एस.एच. 5,6 एवं 9 की बुवाई करें। 2. रोग की संभावना होने पर 2.5 किलो जाईनेब 80 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. या डेढ से दो किलो मेंकोजेब 75 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. का प्रति हैक्टर की दर से छिड़काव करें। आवश्यकतानुसार 15 दिन बाद पुनः छिड़काव करें।
		तना मक्खी	बुवाई करते समय कतारों में बीज से 3 से.मी. नीचे कार्बोफ्यूरान 3 प्रतिशत कण 15 किलो प्रति हैक्टर की दर से कूड में उरकर दवें।
		सैन्य कीट	मिथाईल पैराथिऑन 2 प्रतिशत चूर्ण 25 किलो प्रति हैक्टर की दर से भुरके।
		तना छेदक	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकाशपाश का उपयोग करें। 2. क्यूनालफॉस 1.5 प्रतिशत कण 8-10 किलो प्रति हैक्टर की दर से बुवाई के 25 दिन बाद पौधों के पोटों में 5-7 कण प्रति पौधा डालें।

क्र. सं.	नाम फसल	नाम कीट/रोग	नियंत्रण के उपाय
		माईट्स	ढाई किलो घुलनशील गन्धक या एक लीटर मिथाईल डिमेटोन 25 प्रतिशत ई.सी. प्रति हैक्टर की दर से पानी में घोलकर छिड़काव करें।
3	मक्का	तना छेदक	1. मक्का की बुवाई के 15–30 दिन में फोरेट 10 जी. अथवा कार्बोफ्यूरोन 3 जी 7.5 किलो प्रति हैक्टर की दर से पौधों के पोटों में डाले अथवा कार्बेरिल 50 प्रतिशत घुलनशील चूर्ण 1.8 किलोग्राम 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हैक्टर छिड़काव करें। 2. जैविक कीट प्रबन्धन हेतु ट्राईकोग्रामा अण्ड परजीवी 1.5 लाख प्रति हैक्टर की दर से फसल की 10,20,30 दिन की अवस्था पर छोड़ना प्रभावी रहता है।
		मोयला (चैपा)	मांजरे निकलते समय एक लीटर मिथाईल डिमेटोन 25 प्रतिशत ई.सी. को 500–600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हैक्टर की दर से छिड़काव करें।
		फड़का व सैन्य कीट	मिथाईल पैराथिऑन 2 प्रतिशत चूर्ण 25 किलो प्रति हैक्टर की दर से भुरकाव करें।
		मेंडिस पत्ती झुलसा रोग	मेंकोजेब 75 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. 0.2 प्रतिशत घोल का छिड़काव फसल की एक माह की अवस्था पर करें। आवश्यकतानुसार छिड़काव 10–15 दिन बाद दोहरावें।

क्र. सं.	नाम फसल	नाम कीट/रोग	नियंत्रण के उपाय
4	कपास (सिंचित क्षेत्र)	सफेद मक्खी, ग्रे वीविल, जैसिड, थ्रिप्स, चैपा, सफेद मक्खी	<p>प्रथम छिड़काव : डाईमिथोएट 30 ई.सी. या मिथाईल डिमेटोन 25 ई.सी. एक लीटर या मेलाथियान 50 ई.सी. सवा लीटर में से किसी एक दवा का छिड़काव कीड़े दिखाई देने पर करें।</p> <p>दूसरा छिड़काव : रस चूसने वाले कीड़ों लीफरोलर व अन्य कीटों के लिए दूसरा छिड़काव जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में करें। मिथाईल पैराथिऑन 2 प्रतिशत चूर्ण 20 किलो ग्राम, या क्यूनालफॉस 25 ई.सी. या मोनोक्रोटोफॉस 36 एस.एल. एक लीटर या कार्बेरिल 50 डब्ल्यू.पी. ढाई किलो प्रति हैक्टर की दर से छिड़काव करें।</p> <p>तीसरा छिड़काव : चितकबरी लट, गुलाबी लट, हेयरी केटरपिलर, ग्रे वीविल की रोकथाम के लिए सवा लीटर क्यूनालफॉस 25 ई.सी. या ढाई किलो कार्बेरिल 50 प्रतिशत घुलनशील चूर्ण या एक लीटर मोनोक्रोटोफॉस 36 एस.एल. या 400-450 मि.ली. परमैथ्रिन 25 ई.सी. या 450 मि.ली. फेनवेलरेट 20 ई.सी. या एक लीटर क्लोरोपाईरीफॉस 20 ई.सी. का प्रति हैक्टर की दर से अगस्त के पहले से तीसरे सप्ताह में छिड़काव करें।</p> <p>चौथा छिड़काव : टिण्डा छेदक, सफेद मक्खी, हरा तेला व चेपा आदि के लिए सितम्बर के प्रथम सप्ताह से तृतीय सप्ताह तक ढाई किलो कार्बेरिल 50 प्रतिशत घुलनशील चूर्ण या एक लीटर मोनोक्रोटोफॉस 36 एस.एल. या क्यूनालफॉस 25 ई.सी. या क्लोरोपाईरीफॉस 20 ई.सी. या 400 मि.ली. परमैथ्रिन 25 ई.सी. या 450 मिली लीटर फेनवेलरेट 20 ई.सी. या सवा लीटर फेनीट्रोथियान 50 ई.सी. का प्रति हैक्टर छिड़काव करें।</p> <p>पांचवा छिड़काव : यदि कीटों का प्रकोप अधिक दिखाई दे तो अक्टूबर माह में उपर्युक्त में से या निम्न दवाओं में किसी एक का छिड़काव करें। 200 मि.ली. साईपरमैथ्रिन 25 ई.सी. या 500 मि.ली. साईपरमैथ्रिन 10 ई.सी. या 400 मि.ली. डेकामैथ्रिन 2.8 ई.सी. या बिटा सिपलूथ्रिन 25 ई.सी. या 240 मि.ली. एल्फामैथ्रिन 10 ई.सी. का छिड़काव करें।</p>
		ब्लेक आर्म (जीवाणु अंगमारी)	इसकी रोकथाम हेतु दूसरे तीसरे एवं चौथे छिड़काव में काम में ली जाने वाली दवा के साथ 8 ग्राम स्ट्रेप्टोसाईक्लीन या 20 ग्राम एग्रीमाईसिन तथा 2 किलो तांबायुक्त फफूंदनाशी दवा मिलाकर छिड़काव करें।

क्र. सं.	नाम फसल	नाम कीट/रोग	नियंत्रण के उपाय
	कपास (असिंचित)	ग्रे वीविल, जैसिड, सफेद मक्खी, तेला, पत्ती मोड़क	<p>प्रथम छिड़काव : जुलाई के आखिरी अथवा अगस्त के पहले सप्ताह में डाईमिथोएट 30 ई.सी. या मिथाईल डेमेटोन 25 ई.सी. एक लीटर या मैलाथिऑन 50 ई.सी. सवा लीटर या मिथाईल पैराथिऑन 2 प्रतिशत चूर्ण 20 किलो का प्रति हैक्टर छिड़काव/भुरकाव करें।</p> <p>द्वितीय छिड़काव : बालवर्म, जैसिड, ग्रे-वीविल आदि की रोकथाम के लिए अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितम्बर के पहले सप्ताह में मोनोक्रोटोफॉस 36 एस.एल.एक लीटर या फेनेट्रोथिऑन 50 ई.सी. सवा लीटर या एसीफेट 75 प्रतिशत एस.पी. 500 ग्राम या कार्बेरिल 50 प्रतिशत घुलनशील चूर्ण ढाई किलो का छिड़काव करें। इसके साथ 8 ग्राम स्ट्रेप्टोसाईक्लिन या 20 ग्राम एग्रीमाईसिन भी मिलाएं।</p> <p>तृतीय छिड़काव : सितम्बर के तीसरे या चौथे सप्ताह में द्वितीय छिड़काव के लिए दी गई दवाओं को काम में लेते हुए तीसरा छिड़काव करें।</p>
	देशी कपास	ग्रे-वीविल, जैसिड, सफेद मक्खी, तेला, पत्ती मोड़क, बालवर्म	<p>देशी कपास के लिए असिंचित क्षेत्र में अमेरिकन कपास के लिए दिये गये अंतिम दो छिड़काव कर देना ही काफी रहता है।</p> <p>समन्वित कीट प्रबन्धन :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण हेतु क्राईसोपर्ला के 50000 अण्डे प्रति हैक्टर छोड़े। 2. हेलीथिस मोथ के लिए एक लाईटट्रेप प्रति 5 हैक्टर क्षेत्र के लिए। 3. अमेरिकन बालवर्म एवं स्पेडोपटेरा कीट नियंत्रण हेतु एन.पी.वी. (एस) 250 एल.ई. प्रति हैक्टर छिड़काव करें।
	कपास (सिंचित)	जड़गलन रोग	इसकी रोकथाम हेतु प्रति किलो बीज को 3 ग्राम पी.सी.एन.बी. (ब्रेसीकोल) या 2 ग्राम कार्बेण्डाजिम 50 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. या 3 ग्राम थायरम 75 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. से उपचारित कर बोये।
5	मूंगफली	सफेद लट नियंत्रण	<ol style="list-style-type: none"> 1. 80 किलो बीज में 2 लीटर क्लोरोपाईरीफॉस 20 ई.सी. या क्यूनालफॉस 25 ई.सी. रसायन मिलाकर बुवाई करें। 2. फेरोमेन ट्रेप ल्योर, 5 फेरोमेन ट्रेप प्रति हैक्टर काम में लें।

क्र. सं.	नाम फसल	नाम कीट/रोग	नियंत्रण के उपाय
		कातरा	<ol style="list-style-type: none"> कातरे के पतंगे के नियंत्रण हेतु प्रकाशपाश का उपयोग करें। एक लाईट्रेप प्रति 5 हैक्टर क्षेत्र हेतु। कातरे की लट वाली अवस्था : मिथाईल पैराथिऑन 2 प्रतिशत चूर्ण या क्यूनालफॉस 1.5 प्रतिशत चूर्ण या फॉसोलोन 4 प्रतिशत चूर्ण या कार्बेरिल 5 प्रतिशत चूर्ण 25 किलो प्रति हैक्टर की दर से भुरकाव करें। जहां पानी उपलब्ध हो वहां पर डाईक्लोरोवास 76 ई.सी. 300 मि.ली. या मिथाईल पैराथिऑन 50 ई.सी. 750 मि.ली. या क्यूनालफॉस 25 ई.सी. 625 मि.ली. या क्लोरोपाईरीफॉस 20 ई.सी. 1 लीटर प्रति हैक्टर छिड़काव करें।
		दीमक	खड़ी फसल में दीमक का प्रकोप दिखाई देने पर 4 लीटर क्लोरोपाईरीफॉस 20 ई.सी. प्रति हैक्टर सिंचाई के साथ दें।
		मोयला	मैलाथिऑन 5 प्रतिशत या मिथाईल पैराथिऑन 2 प्रतिशत चूर्ण 25 किलो प्रति हैक्टर की दर से भुरकाव करें या मैलाथिऑन 50 प्रतिशत ई.सी. सवा लीटर या मिथाईल पैराथिऑन 50 ई.सी. 750 मि.ली. या मिथाईल डिमेटोन 25 ई.सी. एक लीटर दवा का घोल बनाकर छिड़काव करें।
		क्राउनरोट	बीजों को 3 ग्राम थाईरम 75 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. या केप्टान 50 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. से उपचारित कर बुवाई करें।
		मकड़ी	मकड़ी का प्रकोप दिखाई देने पर गंधक का चूर्ण 16-20 किलो प्रति हैक्टर की दर से भुरकें।
		टिक्का रोग	कार्बेण्डेजिम 50 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. आधा ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का अथवा एक से डेढ़ किलो मैकोजेब 75 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. का प्रति हैक्टर छिड़काव करें। इसके पश्चात् 10-15 दिन के अन्तराल पर ऐसे दो छिड़काव करें।
		पिलिया रोग	0.5 प्रतिशत फेरससल्फेट (हरा कसीस) के घोल का प्रति हैक्टर छिड़काव करें इसके अभाव में गंधक के तेजाब के 0.1 प्रतिशत घोल का फसल में फूल आने से पहले एक बार तथा पूरे फूल आ जाने के बाद दूसरी बार छिड़काव करें।
6	सोयाबीन	फड़का	मिथाईल पैराथिऑन 2 प्रतिशत या मैलाथिऑन 5 प्रतिशत चूर्ण 25 किलो प्रति हैक्टर की दर से भुरकाव करें।

क्र. सं.	नाम फसल	नाम कीट/रोग	नियंत्रण के उपाय
		तना व पत्ती छेदक	नियंत्रण हेतु फेन्थिऑन 82.5 प्रतिशत ई.सी. या क्यूनालफॉस 25 प्रतिशत ई.सी. 500-700 मि.ली. या मिथाईल पैराथिऑन 50 प्रतिशत 300-500 मि.ली. प्रति हैक्टर की दर से 500-700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
		तेला, जेसिड्स	इनकी रोकथाम हेतु डायमिथोएट 30 ई.सी. या मिथाईल डिमेटोन 25 ई.सी. 400-600 मि.ली. दवा को प्रति हैक्टर की दर से 400-600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आवश्यकतानुसार तीन सप्ताह पश्चात् छिड़काव पुनः दोहरावें।
		गर्डल बीटल	इसकी रोकथाम हेतु फेन्थिऑन 82.5 प्रतिशत ई.सी. या डाईमिथोएट 30 ई.सी. या मोनोक्रोटाफॉस 36 एस.एल. 600-1000 मि.ली. दवा प्रति हैक्टर की दर से 400-600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
		बालो वाली लट	1. कीट प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। 2. क्यूनालफॉस 1.5 प्रतिशत या मिथाईल पैराथिऑन 2 प्रतिशत का 25 किलो प्रति हैक्टर की दर से भुरकाव करें।
		सोयाबीन की हरी अर्ध कुण्डलक (सेमीलूपर)	इसकी रोकथाम हेतु ट्राईजोफॉस 40 ई.सी. का 800 मि.ली. की दर से बुवाई के 25 से 45 दिन बाद छिड़काव करें या प्रति हैक्टर एक लीटर बी.टी. का समुचित पानी की मात्रा में घोल बनाकर छिड़काव करें। 30-35 दिन की फसल अवस्था पर प्रति हैक्टर 1.5 लीटर क्यूनालफॉस 25 ई.सी. या क्लोरपायरीफॉस 20 ई.सी. का छिड़काव करें। समन्वित कीट प्रबन्धन : 1. बीज की मात्रा 80 कि.ग्रा. प्रति हैक्टर रखें। 2. नाशीकीटों की निगरानी हेतु प्रकाशपाश व फेरोमोन ट्रेप 5 से 7 प्रति हैक्टर का उपयोग करें। 3. मोथ हेतु एक लाईटट्रेप प्रति 5 हैक्टर
		पीलिया रोग	फसल में जब भी पीलापन दिखाई दे तभी 0.1 प्रतिशत गंधक का तेजाब या 0.5 प्रतिशत फेरस सल्फेट (हरा कसीस) का छिड़काव करें।
		जीवाणु रोग	इसकी रोकथाम हेतु 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाईक्लिन 20 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। आवश्यकतानुसार दूसरा छिड़काव 15 दिन बाद करें।

क्र. सं.	नाम फसल	नाम कीट/रोग	नियंत्रण के उपाय
		विषाणु रोग	<ol style="list-style-type: none"> 1. रोग ग्रस्त पौधों को ऊखाड़ कर नष्ट करें। 2. डाईमिथोएट 30 प्रतिशत ई.सी./मिथाईल डिमेटोन 25 ई.सी. 500–600 मि.ली. दवा को 500–600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हैक्टर की दर से छिड़काव करें। आवश्यकतानुसार 15 दिन बाद पुनः छिड़काव करें।
		पत्ती धब्बा रोग	इसकी रोकथाम हेतु एक से सवा किलो मेंकोजेब 75 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. प्रति हैक्टर की दर से छिड़कें।
		माईकोप्लाज्मा	नियंत्रण हेतु डायमिथोएट 30 ई.सी. या मिथाईल डिमेटोन 25 ई.सी. 500 मि.ली. दवा को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हैक्टर छिड़कें।
		तना गलन	<ol style="list-style-type: none"> 1. पौधों को उखाड़ कर नष्ट करें। 2. अगले वर्ष उस खेत में सोयाबीन की बुवाई नहीं करें। 3. रोकथाम हेतु डेढ़ से दो किलो मेंकोजेब 75 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. का 600–700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
		फली झुलसा रोग	रोग दिखाई देते ही कार्बेन्डाजिम 50 डब्ल्यू.पी. के 0.05 प्रतिशत घोल के दो छिड़काव 15 दिन के अन्तराल पर करें।
7	धान	जेसिड, थ्रिप्स एवं प्लान्ट हॉपर गंधीबग	कीट लगने पर एक लीटर मोनोक्रोटोफॉस 36 एस.एल. या 500 मि.ली. डायमिथोएट 30 ई.सी. या 800 मि.ली. मिथाईल डिमेटोन 25 ई.सी. को प्रति हैक्टर 600 लीटर पानी में पौध लगाने के 30 से 35 दिन बाद 2–3 सप्ताह के अन्तर पर 2–3 बार छिड़काव करें। गंधीबग का प्रकोप दाने की दूधिया अवस्था पर होता है इसका प्रकोप होने पर कार्बेरिल 5 प्रतिशत चूर्ण या मिथाईल पैराथिऑन 2 प्रतिशत चूर्ण या मेलाथिऑन 5 प्रतिशत चूर्ण 25 किलो प्रति हैक्टर की दर से भुरकें।
		सैन्य कीट एवं शीर्ष लट	इसकी रोकथाम के लिए मिथाईल पैराथिऑन 50 ई.सी. 250–300 मि.ली. या क्यूनालफॉस 25 ई.सी. या 750–800 मि.ली. का 600–700 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हैक्टर की दर से छिड़काव करें। अगर छिड़काव संभव नहीं हो तो मिथाईल पैराथिऑन 2 प्रतिशत चूर्ण 25 किलो प्रति हैक्टर की दर से भुरके।
		जीवाणु अंगमारी रोग	इसकी रोकथाम के लिए 25 ग्राम स्ट्रेप्टोसाईक्लिन प्रति हैक्टर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आवश्यकता हो तो 10–15 दिन बाद यह छिड़काव दोहरावें।

क्र. सं.	नाम फसल	नाम कीट/रोग	नियंत्रण के उपाय
		ब्लास्ट एवं पत्ती धब्बा रोग	रोग का प्रकोप होने पर एक से सवा किलो मैकोजेब 75 प्रतिशत डब्ल्यू पी का घोल बनाकर छिड़काव करें।
		जस्ते की कमी	इसकी रोकथाम हेतु 5 किलो जिंक सल्फेट तथा ढाई किलो चूना प्रति हैक्टर की दर से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़कें।
8	तिल	पत्ती व फली छेदक	इसके नियंत्रण हेतु क्यूनालफॉस 25 ई.सी. या मोनोक्रोटोफॉस 36 प्रतिशत एस.एल. एक लीटर या कार्बेरिल 50 प्रतिशत घुलनशील चूर्ण 2 से 3 किलो प्रति हैक्टर की दर से फूल व फली आते समय छिड़काव करें।
		गॉलमक्खी, सैन्य कीट, हॉक मोथ एवं फड़का	इसकी रोकथाम हेतु मैलाथियोन 5 प्रतिशत चूर्ण या मिथाईल पैराथिऑन 2 प्रतिशत चूर्ण 20-25 किलो प्रति हैक्टर की दर से भुरके। पानी की सुविधा वाले क्षेत्रों में कार्बेरिल 50 प्रतिशत घुलनशील चूर्ण 0.1 प्रतिशत या मोनोक्रोटोफॉस 36 प्रतिशत एस.एल. 0.04 प्रतिशत के घोल का छिड़काव करें।
		झुलसा एवं अंगमारी	इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही मैकोजेब 75 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. या जाईनेब 80 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. डेढ़ किलो या कैप्टान 75 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. 2 से 2.5 किलो प्रति हैक्टर की दर से 15 दिन के अन्तर पर छिड़काव करें।
		छाछया	इसके नियंत्रण हेतु 20 किलो गंधक का चूर्ण प्रति हैक्टर भुरकाव करें अथवा 200 ग्राम कार्बेण्डेजिम 50 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. या डायनोकेप 48 प्रतिशत ई.सी. 200 मि.ली. का प्रति हैक्टर की दर से छिड़काव करें।
		जड़ व तना गलन	इसकी रोकथाम हेतु बुवाई के पूर्व बीज को 1 ग्राम कार्बेण्डेजिम 50 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. + 2 ग्राम थाईरम 75 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. या 2 ग्राम कार्बेण्डेजिम 50 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. या 4 ग्राम ट्राईकोडरमा विरडी प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें।
		पत्तियों के धब्बे	रोकथाम हेतु बुवाई से पूर्व बीजों को 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाईक्लिन या 10 ग्राम पौषामाईसिन के 10 लीटर पानी के घोल में 2 घंटे डूबोकर, सूखाने के बाद खेत में बोए। बुवाई के डेढ़ से 2 माह के बाद 20 ग्राम स्ट्रेप्टोसाईक्लिन प्रति हैक्टर के 15-15 दिन के अन्तराल से 2-3 बार छिड़काव करें।
		पत्ती विषाणु रोग	इसके नियंत्रण हेतु क्यूनालफॉस 25 ई.सी. एक लीटर प्रति हैक्टर की दर से दो बार बुवाई के 25 दिन एवं 40 दिन बाद छिड़काव करें।

क्र. सं.	नाम फसल	नाम कीट/रोग	नियंत्रण के उपाय
9	अरण्डी	जेसिड	इसके नियंत्रण हेतु 1 लीटर मोनोक्रोटोफॉस 36 प्रतिशत एस.एल. प्रति हैक्टर की दर से छिड़काव करें।
		पत्ती धब्बा एवं झुलसा	इस रोग के नियंत्रण हेतु 2 किलो मेंकोजेब 75 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. का पानी में घोल बनाकर प्रति हैक्टर छिड़कें।
10	खरीफ दलहन	कातरा	1. एक लाईटट्रेप प्रति 5 हैक्टर। 2. कातरे की लट वाली अवस्था में मिथाईल पैराथिऑन 2 प्रतिशत चूर्ण या क्यूनालफॉस 1.5 चूर्ण या कार्बेरिल 5 प्रतिशत चूर्ण या फोसलॉन 4 प्रतिशत चूर्ण 25 किलो प्रति हैक्टर की दर से भुरकाव करें। 3. जहां पानी उपलब्ध हो, वहां डाईक्लोरोवास 76 प्रतिशत ई.सी. 300 मिलीलीटर या मिथाईल पैराथिऑन 50 ई.सी. 750 मिलीलीटर या क्यूनालफॉस 25 ई.सी. 625 मिलीलीटर या क्लोरोपाईरीफॉस 20 ई.सी. एक लीटर प्रति हैक्टर का छिड़काव करें।
		मोयला, हरा तेला व मक्खी	इनकी रोकथाम हेतु मैलाथियॉन 50 ई.सी. या डायमिथोएट 30 ई.सी. एक लीटर या मैलाथियान 5 प्रतिशत चूर्ण 25 किलो प्रति हैक्टर की दर से प्रयोग करें।
		फली छेदक	इसके नियंत्रण हेतु मोनोक्रोटोफॉस 36 एस.एल. या क्यूनालफॉस 25 ई.सी. या मेलाथिऑन 50 प्रतिशत ई.सी. 1 लीटर या कार्बेरिल 50 प्रतिशत घुलनशील चूर्ण ढाई किलोग्राम या थोयोडिकार्ब 70 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. 625 ग्राम प्रति हैक्टर की दर से फूल व फली आते समय प्रयोग करें।
		छाछया रोग	इसकी रोकथाम हेतु ढाई किलो घुलनशील गंधक या एक लीटर डायनोकेप 48 प्रतिशत ई.सी. प्रति हैक्टर 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़कें।
		पीलिया रोग	इसके नियंत्रण हेतु 0.1 प्रतिशत गंधक के तेजाब या 0.5 प्रतिशत फेरस सल्फेट (हरा कशीश) का छिड़काव करें।
11.	ग्वार	मोयला, सफेद मक्खी व हरा तेला	इनकी रोकथाम हेतु मोनोक्रोटोफॉस 36 प्रतिशत एस.एल. या डायमिथोएट 30 ई.सी. एक लीटर दवा छिड़कें अथवा मैलाथियान 5 प्रतिशत चूर्ण 25 किलो प्रति हैक्टर भुरकें।
		झुलसा	खड़ी फसल में 2.5 किलो तांबायुक्त फफूंदीनाशी प्रति हैक्टर की दर से छिड़कें।

क्र. सं.	नाम फसल	नाम कीट/रोग	नियंत्रण के उपाय
		छाछया रोग	25 किलो गंधक का चूर्ण भुरकें या एक लीटर डायनोकेप 48 प्रतिशत ई.सी. का छिड़काव प्रति हैक्टर करें।
12.	गेहूँ	1. दीमक	खड़ी फसल में दीमक की रोकथाम हेतु क्लोरोपायरीफॉस 20 ई.सी. चार लीटर प्रति हैक्टर सिंचाई के साथ दें।
		2. शूट फलाई	इसके उपचार हेतु मोनोक्रोटोफॉस 36 प्रतिशत एस.एल. 500 मिलीलीटर या फोसोलोन 35 ई.सी. 750 मिलीलीटर का अंकुरण के तीन चार दिन के अन्दर छिड़काव करें।
		3. मकड़ी, मोयला व तेला	इनकी रोकथाम हेतु मिथाईल डेमेटोन 25 ई.सी. या डायमिथोएट 30 ई.सी. एक लीटर या मैलाथियान 50 ई.सी. एक से डेढ लीटर या क्यूनालफॉस 25 ई.सी. 800 से 1000 मिलीलीटर का प्रति हैक्टर की दर से छिड़काव करें।
		4. रोली रोग	1. रोग नियन्त्रण हेतु रोली रोधी किस्मों की बुवाई करें। 2. दो किलो मैन्कोजेब 75 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. का प्रति हैक्टर की दर से पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
		5. अनावृत कण्डवा	बीज की बुवाई के पूर्व दो ग्राम कार्बोक्सिन 75 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. या कार्बेण्डाजिम 50 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. से प्रति किलो बीज को उपचारित करें।
		6. चूहा नियन्त्रण	इनकी रोकथाम हेतु एक भाग जिंक फास्फाईड को 47 भाग आटे, 2 भाग तिल या मूंगफली के तेल और एक भाग गुड़ में मिलाकर विषैला चुग्गा तैयार करें। प्रत्येक आबाद बिल में 6 ग्राम चुग्गा रखें या ब्रोमोडायलिन .005 प्रतिशत बेट (15 ग्राम प्रति बिल) चूहा नियंत्रण हेतु 25 बिल प्रति हैक्टर से अधिक होने पर काम में लें।
13.	जौ	ब्ल्यू बीटल और फील्ड क्रिकेट्स	कीट ग्रस्त खेतों में प्रति हैक्टर 25 किलो मिथाईल पैराथियोन 2 प्रतिशत चूर्ण का भुरकाव करें।
		2. मकड़ी, मोयला एवं तेला	इनके उपचार हेतु मिथाईल डेमेटोन 25 ई.सी. या डायमिथोएट 30 ई.सी. एक लीटर प्रति हैक्टर की दर से छिड़काव करें।
		3. दीमक	खड़ी फसल में दीमक नियन्त्रण हेतु क्लोरोपायरीफॉस 20 ई.सी. चार लीटर प्रति हैक्टर सिंचाई के साथ दें।
		4. रोली रोग	इसकी रोकथाम हेतु 25 किलो गंधक का चूर्ण प्रति हैक्टर की दर से भुरकाव करें या रोग के प्रारम्भ होते ही ट्राईडेमोर्फ 80 प्रतिशत ई.सी. 750 मिलीलीटर प्रति हैक्टर छिड़कें।

क्र. सं.	नाम फसल	नाम कीट/रोग	नियंत्रण के उपाय
		5. मोल्या रोग	<ol style="list-style-type: none"> 1. मोल्यारोधी किस्मों की बुवाई करें। 2. फसल चक्र में चना, सरसों, प्याज, सूरजमुखी, मैथी, आलू या गाजर की फसल बोएँ। 3. गर्मी में खेतों की गहरी जुताई करें। 4. जिन खेतों में रोग का अधिक प्रकोप हो वहां बुवाई से पूर्व 30 किलो कार्बोफ्यूरोन 3 प्रतिशत कण प्रति हैक्टर की दर से भूमि में उरकर बुवाई करें।
		6. चूहों की रोकथाम	इनकी रोकथाम हेतु एक भाग जिंक फास्फाईड को 47 भाग आटे, 2 भाग तिल या मूंगफली के तेल और एक भाग गुड़ में मिलाकर विषैला चुग्गा तैयार करें तथा चूहों के आबाद बिलों में 6 ग्राम चुग्गा प्रति बिल रखें या ब्रोमोडायलिन .005 प्रतिशत बेट (15 ग्राम प्रति बिल) चूहा नियंत्रण हेतु 25 बिल प्रति हैक्टर से अधिक होने पर काम में लें।
14.	चना	1. कटवर्म, दीमक एवं वायर वर्म	इनकी रोकथाम के लिए क्यूनालफॉस 1.5 प्रतिशत चूर्ण 25 किलो प्रति हैक्टर की दर से आखिरी जुताई से पूर्व भुरकें।
		2. फली छेदक	<ol style="list-style-type: none"> 1. इसकी रोकथाम हेतु फूल आने से पहले व फली लगने के बाद मैलाथिऑन 5 प्रतिशत या क्यूनालफॉस 1.5 प्रतिशत या कार्बेरिल 5 प्रतिशत या फैन्थोएट 2 प्रतिशत चूर्ण 25 किलो प्रति हैक्टर भुरकें। 2. फली छेदक नियंत्रण हेतु फूल आते समय एन.पी.वी. 250 एल.ई. 125 मिली लीटर तथा 625 मिलीलीटर प्रति हैक्टर का पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अन्तराल पर तीन छिड़काव करें अथवा क्यूनालफॉस 25 ई.सी. एक लीटर या मैलाथिऑन 50 ई.सी. या फेनिट्रोथिऑन 25 ई.सी. सवा लीटर या मोनोक्रोटोफॉस 36 प्रतिशत एस.एल. एक लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हैक्टर की दर से छिड़काव करें। या फलीछेदक के नियंत्रण हेतु लगभग 50 प्रतिशत फूल आने पर नीम का तेल 700 मिलीलीटर प्रति हैक्टर का छिड़काव करें। 3. एक लाईट ट्रेप प्रति 5 हैक्टर उपयोग में लें।
		3. झुलसा रोग	झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देते ही मैन्कोजेब 75 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. 0.2 प्रतिशत या कॉपर आक्सीक्लोराईड 50 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. 0.3 प्रतिशत या घुलनशील गंधक 0.2 प्रतिशत घोल का 10 दिन के अन्तराल पर चार छिड़काव करें।

क्र. सं.	नाम फसल	नाम कीट/रोग	नियंत्रण के उपाय
		4. जड़गलन	6 से 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करें या कार्बेण्डेजिम 50 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. 1 ग्राम या थाईरम 75 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज दर से उपचारित करें।
15.	सरसों	1. पैन्टेड बग व आरामकखी	इनकी रोकथाम हेतु क्यूनालफॉस 1.5 प्रतिशत या मैलाथियोन 5 प्रतिशत या मिथाईल पैराथियोन 2 प्रतिशत या कार्बेरिल 5 प्रतिशत चूर्ण 20-25 किलो प्रति हैक्टर की दर से भुरकाव करें।
		2. मोयला	मोयला की रोकथाम हेतु मिथाईल पैराथियोन 2 प्रतिशत या मैलाथियोन 5 प्रतिशत या कार्बेरिल 5 प्रतिशत चूर्ण 20-25 किलो प्रति हैक्टर भुरकें या पानी की सुविधा वाले स्थानों पर मैलाथियोन 50 ई.सी. सवा लीटर या डाई मिथेएट 30 ई.सी. या कार्बेरिल 50 प्रतिशत घुलनशील चूर्ण ढाई किलो या मिथाईल डिमेटोन 25 ई.सी. एक लीटर अथवा क्लोरोपाईरीफॉस 20 ई.सी. 600 मिलीलीटर प्रति हैक्टर की दर से पानी में मिलाकर छिड़कें।
		3. लीफ माईनर	लीफ माईनर की रोकथाम हेतु क्यूनालफॉस 25 ई.सी. 700 मिलीलीटर या मिथाईल पैराथियोन 50 ई.सी. 500 मिलीलीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। जहां छिड़काव सम्भव नहीं हो वहां पर या मैलाथियोन 5 प्रतिशत या कार्बेरिल या 5 प्रतिशत मिथाईल पैराथियोन 2 प्रतिशत चूर्ण 20-25 किलो प्रति हैक्टर भुरकें।
		4. झुलसा, तुलासिता व सफेद रोली	1. इन रोगों के लक्षण दिखाई देते ही दो किलो मैन्कोजेब 75 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. या ढाई किलो जाईनेब 80 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. प्रति हैक्टर पानी में मिलाकर छिड़कें। 2. सफेद रोली के लक्षण दिखाई देने पर मैटालेक्सल 8 प्रतिशत + मैन्कोजेब 64 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। आवश्यकतानुसार यह छिड़काव 20 दिन के अन्तराल पर दोहरायें।
		5. छाछया	इसकी रोकथाम हेतु प्रति हैक्टर 20 किलो गंधक चूर्ण भुरकें या ढाई किलो घुलनशील गन्धक या 750 मिलीलीटर डाइनोकेप 48 प्रतिशत ई.सी. पानी में मिलाकर छिड़कें।

नोट:- उपरोक्त सिफारिशों का प्रयोग करते समय खण्डीय सिफारिश का ध्यान रखें।